



등록특허 10-2565268



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2023년08월10일
(11) 등록번호 10-2565268
(24) 등록일자 2023년08월04일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

C11B 9/00 (2021.01)

(52) CPC특허분류

C11B 9/0015 (2013.01)*C11B 9/008* (2013.01)

(21) 출원번호 10-2018-0114799

(22) 출원일자 2018년09월27일

심사청구일자 2020년11월11일

(65) 공개번호 10-2020-0035587

(43) 공개일자 2020년04월06일

(56) 선행기술조사문헌

추천 전자담배 액상 후기 - 조이리퀴드 누룽지향,
블루베리, 퍼치키스 by 디셉트 님. 네이버
블로그, [online], 2016년 5월 17일, [2022년 10
월 26일 검색], 인터넷: <URL:
<https://blog.naver.com/joylife06/22071176814>

7> 1부.*

홍석찬 외 6명, ‘한국형 후각검사 KVSS Test의 개
발’ 대한이비인후과학회지, 제42권, 855~860쪽,
(1999.12.31.) 1부*

KR1020100080127 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

연세대학교 산학협력단서울특별시 서대문구 연세로 50 (신촌동, 연세대
학교)**주식회사 아로마사이언스**경기도 수원시 영통구 신원로 306, 2동203호(원천
동, 이노플렉스)

(72) 발명자

윤주현서울특별시 강남구 삼성로 150, 209동 1302호
김창훈서울특별시 서초구 반포대로 275, 114동 3001호
(래미안퍼스티지아파트)

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

파도특허법인유한회사

전체 청구항 수 : 총 5 항

심사관 : 박소일

(54) 발명의 명칭 **후각 검사용 향료 조성물****(57) 요 약**

본 발명의 목적은 한국인을 대상으로 하는 후각 검사 시 한국인의 후각 경험에 최적화된 신규한 향료 조성물을 제공하는 것이다.

대 표 도

(52) CPC특허분류
C11B 9/0092 (2013.01)
G01N 33/0001 (2013.01)

(72) 발명자

조형주서울특별시 서초구 잠원로8길 35, 103동 1802호(잠
원동, 래미안 신반포 팰리스)**김창고**경기도 성남시 분당구 정자동로 248, 612동 2503
호(정자동, 파크뷰)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	2016M3A9D5A01952414
부처명	과학기술정보통신부
과제관리(전문)기관명	한국연구재단
연구사업명	바이오·의료기술개발사업
연구과제명	후각기 2차 표현형분석기반 구축 및 서비스 제공
기 예 율	1/2

과제수행기관명 연세대학교

연구기간 2018.09.20 ~ 2019.07.19

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	2016R1A5A2008630
부처명	과학기술정보통신부
과제관리(전문)기관명	한국연구재단
연구사업명	선도연구자지원사업
연구과제명	미각연구센터
기 예 율	1/2
과제수행기관명	연세대학교
연구기간	2019.01.01 ~ 2019.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

누룽지향을 포함하는 향료 조성물로서,

2-아세틸피라진(2-Acetylpyrazine), 델타-도데칼락톤(delta-Dodecalactone) 및 메틸사이클로펜텐올론(Methylcyclopentenolone)을 포함하는, 조성물.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

제 1항에 있어서,

상기 2-아세틸피라진은 0.119 중량% 내지 0.25 중량%, 델타-도데칼락톤은 0.093 중량% 내지 0.17 중량%, 및 메틸사이클로펜텐올론은 0.068 중량% 내지 0.16 중량%, 그리고 용매로 트리아세틴은 99.42 중량% 내지 99.72 중량%인, 향료 조성물.

청구항 6

제 1항에 있어서,

상기 향료 조성물은 후각인지능력의 정상 여부를 판단하기 위한, 향료 조성물.

청구항 7

삭제

청구항 8

삭제

청구항 9

2-아세틸피라진(2-Acetylpyrazine), 델타-도데칼락톤(delta-Dodecalactone), 및 메틸사이클로펜텐올론(Methylcyclopentenolone)을 혼합하는 단계를 포함하는, 누룽지 향료 제조 방법.

청구항 10

제 9항에 있어서,

상기 2-아세틸피라진은 0.119 중량% 내지 0.25 중량%, 델타-도데칼락톤은 0.093 중량% 내지 0.17 중량%, 및 메틸사이클로펜텐올론은 0.068 중량% 내지 0.16 중량%, 그리고 용매로 트리아세틴은 99.42 중량% 내지 99.72 중량%인, 누룽지 향료 제조 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 후각 검사용 향료 조성물 및 향료 조성물 제조 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 현대 사회가 산업화되어 감에 따라 각종 화학물질 노출 등의 산업 재해나 교통사고 등의 외상성 후각 장애가 늘어나고 있다. 또한, 황사 또는 미세먼지 등에 의한 대기 오염이 증가하면서 부비동염, 비염, 및 알레르기 비염 등의 환자도 증가함에 따라 후각 장애 환자의 수는 계속 증가 중이다. 또한, 교통사고나 뇌졸중 등으로 인한 뇌손상 환자나, 인구의 노령화와 파킨슨병, 또는 알츠하이머와 같은 퇴행성 질환에 의한 후각 장애도 증가하고 있다(Deems et al., Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1991, 117:519-28). 이러한 연구로부터 후각기관은 종추신경계에 직접 연결되어 있어서 기억력과 감정을 조절하는데 중요한 역할을 한다는 것이 널리 알려져 있다. 또한, 후각기관의 기능은 치매나 파킨슨 질환, 우울증 등에 밀접하게 관련되어 있으므로 후각기관의 기능이 퇴화되지 않도록 훈련하는 것이 매우 중요하다.

[0003] 이에, 후각진단은 병력, 후각기능검사, 이학적 검사를 통해 이루어지고 있다. 현재 후각기능의 정도를 판단하거나 훈련하기 위해 사용되는 테스트 방법으로는 UPSIT(The University of Pennsylvania Smell Identification Test), Sniffin' Sticks 후각검사, T&T 후각검사(Toyoda and Takagi's Perfumist's Strip Method), 부탄올 역치 검사(butanol threshold test: BTT), CC-SIT(Cross Cultural Smell Identification Test) 등을 들 수 있다. 각 국가의 문화와 지역 특성에 맞는 여러 가지의 후감검사들이 개발되어 혼용되고 있다.

[0004] 국내에는 건국의대 이비인후과 연구진들이 발표한 연구들이 가장 대표적으로, Sniffin' Sticks 후각검사를 일부 변형하여 한국어 버전의 후각기능검사 (Korean Version of Sniffin Stick test II: KVSS-II)를 개발하였다. 따라서, 이를 임상적으로 적용하여 후각 기능 저하를 평가하였다. 그러나 기본적으로 공산품에 해당하는 제품으로 의료기기 또는 의약외품 또는 의약품의 허가를 받지 않아 사용에 제한이 있는 상태이다.

[0005] 또한, 국내 공개특허 제2007-0099100호는 후각테스트용 카트리지를 제안하고 있고, 카트리지에 도포된 후각캡슐을 비벼서 터트린 후에 냄새를 맡아 평가하는 도구이다. 미국등록특허 제6558322호를 살펴보면, 사용자의 후각인지능력을 판별하는 방법과 향 보관 컨테이너, 향 보관 컨테이너를 그룹별로 구분하여 올려놓는 보드 등에 관한 것이다.

[0006] 그러나, 이들 검사법은 가격이 비싸고 한국인에게 적합하지 않은 냄새 아이템들을 이용함으로써 신뢰성이 낮다. 따라서, 한국인을 대상으로 하는 후각인지능력의 정상 여부를 간단하고 정량적이며 객관적으로 판단 가능한 향료 조성물이 필요한 실정이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명의 목적은 한국인을 대상으로 하는 후각 검사 시 한국인의 후각 경험에 최적화된 신규한 향료 조성물 및 향료 조성물 제조 방법을 제공하는 것이다.

[0008] 또한, 이러한 발명의 목적은 한국인에게 검사하기 적합한 후각 검사 향료 조성물 중에서도, 한국인을 대상으로 검사하여 높은 정답률을 가진 것을 선별하는 등의 표준화 작업을 통한 향료 조성물을 제공한다.

[0009] 그러나, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 과제에 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0010] 이하, 본원에 기재된 다양한 구현예가 도면을 참조로 기재된다. 하기 설명에서, 본 발명의 완전한 이해를 위해서, 다양한 특이적 상세사항, 예컨대, 특이적 형태, 조성물 및 공정 등이 기재되어 있다. 그러나, 특정의 구현예는 이들 특이적 상세 사항 중 하나 이상 없이, 또는 다른 공지된 방법 및 형태와 함께 실행될 수 있다. 다른 예에서, 공지된 공정 및 제조 기술은 본 발명을 불필요하게 모호하게 하지 않게 하기 위해서, 특정의 상세사항으로 기재되지 않는다. "한 가지 구현예" 또는 "구현예"에 대한 본 명세서 전체를 통한 참조는 구현예와 결부되어 기재된 특별한 특징, 형태, 조성 또는 특성이 본 발명의 하나 이상의 구현예에 포함됨을 의미한다. 따라서, 본 명세서 전체에 걸친 다양한 위치에서 표현된 "한 가지 구현예에서" 또는 "구현예"의 상황은 반드시 본 발명의 동일한 구현예를 나타내지는 않는다. 추가로, 특별한 특징, 형태, 조성, 또는 특성은 하나 이상의 구현예에

서 어떠한 적합한 방법으로 조합될 수 있다.

[0011] 본 발명 내 특별한 정의가 없으면 본 명세서에 사용된 모든 과학적 및 기술적인 용어는 본 발명이 속하는 기술 분야에서 당업자에 의하여 통상적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다.

[0012] 본 발명에서 상기 "목적하는 개체", "검사 대상체" 또는 "대상체"란 외상성 후각 장애, 뇌졸증 또는 교통사고 등으로 인한 뇌손상, 또는 부비동염, 비염, 및 알레르기 비염과 같은 원인으로 인한 후각 기능 이상자 또는 노령화, 치매, 과민증, 알츠하이머와 같은 퇴행성 질환을 앓아 후각에 장애가 있는 것으로 표현되어 진단 또는 치료가 필요하거나 예상되는 환자를 의미하는 것일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0013] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 복숭아향, 및 누룽지향로 이루어진 군으로부터 어느 하나 이상을 포함하는 향료 조성물을 제공한다.

[0014] 발명의 일 구체예에서, 상기 복숭아향은 리날로올(Linalool), 베독스(Verdox), 알데히드 C-14(Aldehyde C-14), 이소아밀 아세테이트(Iso Amyl Acetate), 및 벤질 살리실레이트(Benzyl Salicylate)를 포함한다. 발명의 다른 구체예에서, 상기 누룽지향은 2-아세틸피라진(2-Acetylpyrazine), 델타-도데칼락톤(delta-Dodecalactone), 및 메틸사이클로펜텐올론 (Methylcyclopentenolone)을 포함한다. 발명의 또 다른 구체예에서, 상기 리날로울은 9.69 중량% 내지 13.11 중량%, 베독스는 5.78 중량% 내지 7.82 중량%, 알데히드 C-14는 1.85 중량% 내지 2.76 중량%, 이소 아밀 아세테이트는 1.54 중량% 내지 2.20 중량%, 및 벤질 살리실레이트는 0.95 중량% 내지 1.61 중량%, 그리고 용매로 DPG (3-(3-하이드록시프록시)프로판-1-올)는 72.5 중량% 내지 80.19 중량%이다. 발명의 또 다른 구체예에서, 상기 2-아세틸피라진은 0.119 중량% 내지 0.25 중량%, 델타-도데칼락톤은 0.093 중량% 내지 0.17 중량%, 및 메틸사이클로펜텐올론은 0.068 중량% 내지 0.16 중량%, 그리고 용매로 트리아세틴(Triacetine)은 99.42 중량% 내지 99.72 중량%이다. 발명의 또 다른 구체예에서, 상기 향료 조성물은 후각인지능력의 정상 여부를 판단하기 위한 것이다.

[0015] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 리날로울(Linalool), 베독스(Verdox), 알데히드 C-14(Aldehyde C-14), 이소아밀 아세테이트(Iso Amyl Acetate), 및 벤질 살리실레이트(Benzyl Salicylate)를 혼합하는 단계를 포함하는, 복숭아 향료 제조 방법을 제공한다.

[0016] 발명의 일 구체예에서, 상기 리날로울은 9.69 중량% 내지 13.11 중량%, 베독스는 5.78 중량% 내지 7.82 중량%, 알데히드 C-14는 1.85 중량% 내지 2.76 중량%, 이소 아밀 아세테이트는 1.54 중량% 내지 2.20 중량%, 및 벤질 살리실레이트는 0.95 중량% 내지 1.61 중량%, 그리고 용매로 DPG (3-(3-하이드록시프록시)프로판-1-올)는 72.5 중량% 내지 80.19 중량%이다.

[0017] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 2-아세틸피라진(2-Acetylpyrazine), 델타-도데칼락톤(delta-Dodecalactone), 및 메틸사이클로펜텐올론 (Methylcyclopentenolone)를 혼합하는 단계를 포함하는, 누룽지 향료 제조 방법을 제공한다.

[0018] 발명의 일 구체예에서, 상기 2-아세틸피라진은 0.119 중량% 내지 0.25 중량%, 델타-도데칼락톤은 0.093 중량% 내지 0.17 중량%, 및 메틸사이클로펜텐올론은 0.068 중량% 내지 0.16 중량%, 그리고 용매로 트리아세틴 99.42 중량% 내지 99.72 중량%이다.

발명의 효과

[0019] 본 발명에서 제공하는 향료 조성물 및 향료 조성물 제조 방법은 한국인을 대상으로 하는 후각 검사 시 한국인의 후각 경험에 최적화된 것으로, 한국인을 대상으로 하여 후각 인지 능력을 검사하는데 있어서, 신뢰성이 높은 검사 결과를 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0020] 도 1은 본 발명의 실시형태에 따른 후각 식별 검사지의 샘플을 나타내는 도면이다.

도 2는 본 발명의 실시형태에 따른 향료 조성물의 성분에 대한 작용기를 나타내는 표이다.

도 3은 본 발명의 실시형태에 따라 도 1의 후각 식별 검사지로 후각 검사를 실시한 경우에 정답 및 오답을 나타내는 표이다.

도 4는 본 발명의 실시형태에 따라 정답률이 95% 이상인 향료 조성물을 선별하여 제작한 후각 식별 검사지의 샘

풀을 나타내는 도면이다.





도 5는 본 발명의 실시형태에 따른 후각 검사 키트를 나타내는 이미지이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용


- [0021] 이하, 실시예를 통하여 본 발명을 더욱 상세히 설명하고자 한다. 이들 실시예는 오로지 본 발명을 보다 구체적으로 설명하기 위한 것으로서, 본 발명의 요지에 따라 본 발명의 범위가 이들 실시예에 의해 제한되지 않는다는 것은 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명할 것이다.
- [0023] 대상 집단
- [0024] 본 발명에 따른 후각 검사 키트를 이용한 후각 검사를 위하여, 비중격 성형 또는 코 성형 수술 예정인 환자를 대상으로 선정하였다. 또한, 후각기능검사(KVSS-II) 결과에 따라 정상 후각을 나타내는 환자를 대상으로 선정하였다. 축농증 등과 같은 염증질환 또는 외상 등과 같은 과거력 없는 환자들을 대상으로 선정하였다.
- [0025] 상기 기준에 적합한, 58명의 환자(남자 36명, 여자 22명, 평균 연령 30.9세, 연령 범위 21 내지 62세)를 선정하였다. 상세하게는, 본 실시예의 대상자는 20대 29명, 30대 22명, 40대 4명, 50대 2명, 및 60대 1명으로 구성되었다. 이들은 모두 KVSS-II 결과 코 양쪽이 수술 전 평가에서 후각 장애 없다고 진단받은 대상자였다.
- [0027] 실험 예 1 : 복숭아 향료 조성물
- [0028] 본 발명에 의한 향료 조성물은 SDE(Simultaneous Distillation Extract)법으로 분석하였다. SDE법은 Likens & Nickerson apparatus method라고도 하며 물과 시료를 함께 섞어서 가온하여 용매를 통해 추출하는 방법이다. 우선, 반응을 약 2시간 30분 동안 시킨 후 용매를 증발시켜 오일을 얻은 다음 GC-MS를 통해 분석한다.
- [0029] 본 발명에 따른 복숭아 향료 조성물은 리날로올(Linalool), 베독스(Verdox), 알데히드 C-14(Aldehyde C-14), 이소아밀 아세테이트(Iso Amyl Acetate), 및 벤질 살리실레이트(Benzyl Salicylate)를 첨가하여 제조하였다.
- [0030] 본 발명의 복숭아 향료 조성물은 조성물 100 중량%에 대하여 이하와 같은 비율로 첨가하였다. 리날로올은 11 중량%, 베독스는 7 중량%, 알데히드 C-14는 2 중량%, 이소 아밀 아세테이트는 2 중량%, 및 벤질 살리실레이트는 1 중량%, 그리고 용매로 DPG (3-(3-하이드록시프록시)프로판-1-올) 77 중량%를 첨가하여, 하기와 같이 향기를 테스팅하였다.
- [0031] 또한, 리날로올은 9.69 중량% 내지 13.11 중량%, 베독스는 5.78 중량% 내지 7.82 중량%, 알데히드 C-14는 1.85 중량% 내지 2.76 중량%, 이소 아밀 아세테이트는 1.54 중량% 내지 2.20 중량%, 및 벤질 살리실레이트는 0.95 중량% 내지 1.61 중량%, 그리고 용매로 DPG (3-(3-하이드록시프록시)프로판-1-올) 72.5 중량% 내지 80.19 중량%의 범위로 동일하게 실험한 결과, 동일한 실험 결과를 얻을 수 있었다.
- [0033] 실험 예 2 : 누룽지 향료 조성물
- [0034] 본 발명에 의한 향료 조성물은 SDE(Simultaneous Distillation Extract)법으로 분석하였다. SDE법은 Likens & Nickerson apparatus method라고도 하며 물과 시료를 함께 섞어서 가온하여 용매를 통해 추출하는 방법이다. 우선, 반응을 약 2시간 30분 동안 시킨 후 용매를 증발시켜 오일을 얻은 다음 GC-MS를 통해 분석한다.
- [0035] 본 발명에 따른 누룽지 향료 조성물은 2-아세틸피라진(2-Acetylpyrazine), 델타-도데칼락톤(delta-Dodecalactone), 및 메틸사이클로펜텐올론 (Methylcyclopentenolone)를 첨가하여 제조하였다.
- [0036] 본 발명의 누룽지 향료 조성물은 조성물 100 중량%에 대하여 이하와 같은 비율로 첨가하였다. 2-아세틸피라진은 0.2 중량%, 델타-도데칼락톤은 0.15 중량%, 및 메틸사이클로펜텐올론은 0.1 중량%, 그리고 용매로 트리아세틴 99.55 중량%를 첨가하여, 하기와 같이 향기를 테스팅하였다.
- [0037] 또한, 2-아세틸피라진은 0.119 중량% 내지 0.25 중량%, 델타-도데칼락톤은 0.093 중량% 내지 0.17 중량%, 및 메틸사이클로펜텐올론은 0.068 중량% 내지 0.16 중량%, 그리고 용매로 트리아세틴 99.42 중량% 내지 99.72 중량%의 범위로 동일하게 실험한 결과, 동일한 실험 결과를 얻을 수 있었다.
- [0039] 실시예
- [0040] 도 1에 나타내는 바와 같은 4지 선다형 문항지를 상기한 대상자에게 제공하였다. 대상자에게 31가지 향료를 냄새 맡게 한 후 문항지에서 정답을 선택하도록 하였다. 각 향료마다 정답률을 측정하였다.

[0041]


도 2에 나타내는 바와 같이, 차후에 작용기에 대하여 검증 가능한 것을 선별하기 위하여 하기와 같이 후보군 향료에 대하여 작용기 별로 정리하였다.




Aromatic



Alcohol



Ester



Acid

[0042]

[0043]

상기한 바와 같이 실시한 후 정답과 오답을 데이터 시트에 표기하였다(도 3). 이들 중 정답률이 95% 이상이며, 모든 작용기에 대해서 검증 가능하며, 한국인의 후각 경험에 익숙하고, 타 검사와 차별성이 있는 향을 선별하였다. 그 결과, 12가지 향을 선별할 수 있었다.

표 1

	Musk	스피아민트	계피	피스	나프탈렌	기스	복숭아	초코렛	누룽지	김치	숯불갈비	베이비파우더	한약
Total	5	5	4	3	7	5	3	2	0	1	2	1	0
정답률 (%)	95.8	95.8	96.6	97.5	94.1	95.8	97.5	98.3	100.0	99.2	98.3	99.2	100.0
Male	2	3	4	2	6	2	3	1	0	1	0	1	0
Female	3	2	0	1	1	3	0	1	0	0	2	0	0
정답률 (%)	92.9	95.2	100.0	97.6	97.6	92.9	100.0	97.6	100.0	95.2	100.0	100.0	100.0

[0044]

[0045] 표 1에 나타내는 바와 같이, 정답률이 95%이며, 상기한 조건을 모두 만족시키는 향으로 최종 검사 항목을 구성하였다.

[0046] 이를 12가지 최종 검사 향료 조성물의 구성 성분을 분석하였다(표 2).

표 2

No.	향료	구성 성분
1	베이비파우더	Anisaldehyde / Methyl Ionone Gamma / Benzyl Acetate / Ethyl Vanillin
2	계피	Cinnamic aldehyde
3	복숭아	Linalool / Verdox / Aldehyde C-14 / Iso Amyl Acetate / Benzyl Salicylate
4	누룽지	2-Acetylpyrazine / delta-Dodecalactone / Methylcyclopentenolone
5	스피아민트	Carvone Laevo
6	초콜릿	Vanillin / Maltol / 2,3,5-Trimethyl pyrazine / Phenyl Ethyl Alcohol
7	홍삼	2-Ethyl-3-Methyl Pyrazine / Menthol / Methyl Cyclopentenolone / Eugenol
8	한약	Celety Ketone / Vetimoss / Methyl Cyclopentenolone / patchouli Alcohol

9	파스	Methyl Salicylate
10	나프탈렌	Indole
11	숯불 고기 향	Furaneol / Vanillin / delta-Dodecalactone / 2-Methyl-3-Tetrahydrafuranol
12	재/연기	alpha-Cedrene / Creosol / Cedrol

[0048] 베이비파우더 향료 조성물은 아尼斯알데히드, 메틸 이오논 감마, 벤질아세테이트 및 에틸 바닐린을 포함하도록 구성하였다. 계피 향료 조성물은 시나믹 알데히드를 포함하고, 복숭아 향료 조성물은 리날로올, 베독스, 알데히드 C-14, 이소 아밀 아세테이트, 및 벤질 살리실레이트를 포함하도록 구성하였다. 또한, 누룽지 향료 조성물은 2-아세틸피라진, 엘타-도데칼락톤, 및 메틸사이클로펜텐올론을 포함하도록 구성하였다. 스피아민트 향료 조성물은 카르본 라에보를 포함하도록 구성하였다. 초콜릿 향료 조성물은 바닐린, 말톨, 2,3,5-트리메틸 피라진, 및 페닐 에틸 알코올을 포함하도록 구성하였다. 홍삼 향료 조성물은 2-에틸-3-메틸 피라진, 멘톨, 메틸 사이클로펜텐올론 및 유게놀을 포함하도록 구성하였다. 한약 향료 조성물은 셀러리 케톤, 베티모스, 메틸 사이클로펜텐올론 및 파솔리 알코올을 포함하도록 구성하였다. 파스 향료 조성물은 메틸 살리실레이트를 포함하도록 구성하였다. 나프탈렌 향료 조성물은 인돌을 포함하도록 구성하였다. 숯불고기 향료 조성물은 퓨라네올, 바닐린, 엘타-도데칼락톤 및 2-메틸-3-테트라하이드로퓨란티올을 포함하도록 구성하였다. 재/연기 향료 조성물은 알파-세드렌, 크레오솔 및 세드롤을 포함하도록 구성하였다.

[0050] 상기한 바와 같은 과정을 통하여 한국인의 후각 경험에 최적화된 향료 조성물을 선별하였고, 또한 도 4에 나타난 바와 같이 한국을 대상으로 하는 후각 검사 키트를 완성하였다.

[0052] 후각 검사

[0053] 후각 검사지는 검사 지시 안내문, 탈부착이 가능한 스티커가 붙어 있어 냄새가 마스킹된 후각 검사 향료 조성물과 선택지를 포함하는 문제지, 및 답변표시지를 포함하도록 구성하였다(도 5). 상기 선택지는 4지선다형이 바람직하지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 검사 향료 조성물은 한국인의 후각 경험에 최적화된 향 종류로 구성하여 후각 검사의 신뢰도를 높게 유지하도록 하였다. 스티커가 붙여진 후각 검사지를 검사 대상자에게 제공하였다. 냄새를 맡기 위해 검사 대상자에게 각 페이지의 스티커를 제거하도록 하였다. 대상자는 스티커가 제거된 부분의 냄새를 맡은 후 문제지의 각 해당 항목별 선택지에서 답을 골라 답변표시지에 답을 표기하도록 하였다. 연상되는 향이 선택지에 없을 경우에는 후각 경험에 가장 가까운 답을 표기하도록 하였다.

[0055] 이상으로 본 발명의 특정한 부분을 상세히 기술하였는 바, 당업계의 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 이러한 구체적인 기술은 단지 바람직한 구현예일 뿐이며, 이에 본 발명의 범위가 제한되는 것이 아닌 점은 명백하다. 따라서, 본 발명의 실질적인 범위는 첨부된 청구항과 그의 등가물에 의하여 정의된다고 할 것이다.


도면

도면1

Smell identification test (후각 식별 검사)

검사일자 :
등록번호 :
환자성명 :


번호	문항		점수
	O	X	
2	스피아민트	사과	오렌지 나무
3	딸기	꽃 계피	레몬
4	커피	송사탕 오이	마늘
5	파스	체리 조코렛	꽃
6	오렌지	토마토 꿀	풀잎
7	자몽	나프탈렌 커피	꽃
8	바나나	풀잎 가스	장미
9	오렌지	커피 사과	옥수수
10	인삼	수박 복숭아	망종
11	조코렛	딸기 양파	포도
12	참기름	커피 막걸리	파인애플
13	복숭아	치즈 에론	체리
14	유자	담배 라일락	커피
15	고기	꿀 파인애플	나무
16	오이	파스 바나나	민트
17	조코렛	쑥 마늘	포도
18	자두	메론 누룽지	아카시아
19	오이	콜라 토마토	체리
20	송사탕	꿀 김치	나무
21	레몬	풀잎 양파	와사비
22	페인트	생강 바나나	홍삼
23	치즈	장미 콜라	딸기
24	옥수수	레몬 숯불강비	비누
25	석유	버누 살구	사과
26	커피	기스 자몽	라벤더
27	원장	담배 아카시아	솔잎
28	베이비파우더	사과 카레	조코렛
29	레몬	나무 오이	꽃
30	메론	생강 바나나	재/연기
31	밀기	포도 한약	김치
32	고무	치즈 풀잎	콜라



도면2

Material	Ketone	Terpene	Aldehyd	Aromatic	Alcohol	Pyan	Ester	Ether	Amine	Thiol	Lactone	Oxime	Acetal	Acid	Dioxole	Dioxole	Triazole	Pyrazine	Thioether	Amide	Thiourea	Sulfide	Distulfid	Furan	Nitro
Cinnamaldehyde (시나리아일드)																									
Cinnamic Acid (시나리아이드)																									
Ethyl Acetoate (에틸아세오테이트)																									
Ethyl Acetate (에틸아세테이트)																									
Methyl Salicylate (메틸살리실레이트)																									
Cis-3-Hexenol (cis-3-헥센올)																									
Indole (인도린)																									
Ellagenol (에리제인)																									
요한석 (요한석)																									
글술가 (글술가)																									
포도 (포도)																									
파인아이클 (파인아이클)																									
마른 (마른)																									
카다 (카다)																									
클 (클)																									
모이 (모이)																									
포크릴 (포크릴)																									
노루 (노루)																									
로즈 (로즈)																									
유자 (유자)																									
오사리 (오사리)																									
유유 (유유)																									
자드 (자드)																									
솔비탈 (솔비탈)																									
티트 (티트)																									
라벨라 (라벨라)																									
아이시아 (아이시아)																									
베이비고(유자)																									
나무 (나무)																									
제일본 (제일본)																									
향우 (향우)																									
그루 (그루)																									

도면3



도면4

Smell identification test (후각 식별 검사)

번호	분향			점수
	O		X	
1	스피아민트	사과	오렌지	나무
2	밀기	꽃	계피	레몬
3	파스	체리	초코렛	꽃
4	자동	나프탈렌	커피	꽃
5	바나나	풀잎	가스	정미
6	인삼	수박	복숭아	땅콩
7	초코렛	쑥	마늘	포도
8	자두	메론	누룽지	아카시아
9	송사탕	꿀	김치	나무
10	옥수수	레몬	숯불갈비	비누
11	베이비로션	사과	카레	초코렛
12	달기	포도	한약	김치
13				

⑩ 세브란스병원 이비인후과

도면5

